

Orchideen der Region Herzogenbuchsee

Ja, Orchideen sind nicht nur etwas Exotisches, die gibt's auch bei uns, aber selten und oft bedroht. Allerdings nicht auf den Bäumen wie in den Tropen, sondern als Blumen am Wegesrand. Die Angaben unter «Vorkommen» beziehen sich aufs Mittelland.

Blütezeit Von Ende April bis im August blühen immer wieder andere Orchideenarten. Die angegebenen Blühtermine variieren je nach Witterungsverlauf im entsprechenden Jahr. Doch die Orchideen können auch entdeckt werden, wenn sie noch nicht blühen. Sogar der Samenstand ist charakteristisch. Von einzelnen Arten hat es nur wenige Einzelpflanzen, von andern viele. In der Region Herzogenbuchsee kommen noch etwa 15 Orchideenarten vor.

Schutz Alle Orchideen sind in der ganzen Schweiz geschützt. Wir bitten sie, keine zu pflücken oder auszugraben.

Meldung Wenn ihnen Orchideenstandorte auffallen, kontaktieren sie uns, damit wir sie erhalten können (Christian Gnägi, 077 454 65 83)

Bürgergemeinde Herzogenbuchsee



Weisse Waldhyazinthe

Platanthera bifolia

Aussehen 20–80 cm hoch, kräftige Pflanze; zwei grundständige, breite, glänzende Blätter und einige kleinere Tragblätter; langer zylindrischer Blütenstand

Blütezeit Mitte Mai–Mitte Juni

Vorkommen Magere Nass- und Trockenwiesen, lichter Wald, Waldwegränder



Rotes Waldvögelein

Cephalanthera rubra

Aussehen meist zierlich (30–60 cm hoch); blaugrüne, längliche Blätter; weit geöffnete rosa Blüte

Blütezeit Juni

Vorkommen Helle, trockene und warme Waldpartien mit etwas Sonne, Felsfuren, Waldwegränder



Breitblättrige Stendelwurz

Epipactis helleborine

Aussehen 20–110 cm hoch, kräftige Pflanze; breite Blätter mit deutlichen Nerven; Traube mit kleinen grünlich-rötlichen Blüten.

Blütezeit Juli–Anfang August

Vorkommen Lichte Laubmischwälder, Waldwegränder



Bleiches Waldvögelein

Cephalanthera damasonium

Aussehen 20–60 cm hoch; breit eiförmige Blätter; gelblich-weiße Blüten

Blütezeit Ende Mai–Mitte Juni

Vorkommen Lichte, trockene Waldpartien; an schattigeren Standorten als die anderen Waldvögelein

Grosses Zweiblatt

Listera ovata

Aussehen 20–60 cm hoch, unscheinbar, grünliche Blüten, zwei fast gegenständige, etwas vom Boden abgehobene Blätter mit deutlichen Nerven.

Blütezeit Mitte Mai–Mitte Juni

Vorkommen Magerwiese, Auenwald, Hecke, Gärten, Obstgärten, grasige Böschungen

Männliches Knabenkraut

Orchis mascula

Aussehen 20–60 cm hoch, schlank, Blätter meist ungefleckt, glänzend, Blattrosette; Blüte purpurrot, Lippe dreilappig

Blütezeit Mitte April–Mitte Mai

Vorkommen Wiese, Moor, lichter Wald, Hecke; eher feucht als trocken; im Mittelland sehr selten

Langblättriges Waldvögelein

Cephalanthera longifolia

Aussehen 15–60 cm hoch, schlank; längliche, kräftig geäderte, am Licht zweizeilig angeordnete Blätter; schneeweisse Blüten mit goldgelbem Punkt.

Blütezeit Ende April–Ende Mai

Vorkommen Lichte Waldpartien und angrenzende Wiesen, Waldwegränder